



SABC(小鼠/兔 IgG)-FITC Kit 说明书

货号: SA0043

产品内容:

封闭液 (5% BSA)	10ml
Bio-羊抗小鼠 IgG 浓缩液	100μl
Bio-羊抗兔 IgG 浓缩液	100μl
SABC-FITC 浓缩液	100μl
稀释液	30ml
抗荧光衰减封片剂	10ml

保存:

如果长时间不使用, 请将所有试剂存放于-20℃, 如经常使用, 可将封闭液, 稀释液, 抗荧光衰减封片剂存放于 2-8℃以方便使用。

产品说明:

本试剂盒适合于一抗为小鼠/兔 IgG 的免疫组化实验, FITC 荧光检测。

SABC 是专为免疫组化和其他免疫检测而设计的, 用以显示组织和细胞中抗原分布。链霉亲和素(StreptAvidin)是一种从链霉菌中提取的蛋白质, 同亲和素一样, 对生物素有极高的亲和力, 亲和素是一个碱性蛋白质 (IP=10), 经改造后可以转变成中性蛋白质。链霉亲和素等电点接近中性, 对组织和细胞的非特异吸附很低, 基于链霉亲和素的免疫组化方法背景很低。SABC 即 StreptAvidin-Biotin Complex, SABC 大约可形成一百个左右的过氧化物酶和五十个左右的链霉亲和素所构成的复合物。大量的酶将保证 SABC 具有很高的敏感性。

操作步骤: (以石蜡切片为例)

1. 切片常规脱蜡至水(三次二甲苯, 三次乙醇)。

2. 可选步骤:

a、热修复抗原, 将切片浸入 0.01M 柠檬酸钠缓冲液 (PH6.0), 电炉或微波炉加热至沸腾 后断电, 间隔 5-10 分钟后, 反复 1-2 次。冷却后 PBS (pH7.2-7.6) 洗涤 1-2 次。

b、酶消化, 滴加消化液, 37℃10 分钟, PBS (pH7.2-7.4) 洗涤 2-3 次。

c、跳过此步, 直接进入下一步。

3. 滴加 5% BSA 封闭液, 室温 20 分钟。甩去多余液体, 免洗。

4. 用稀释液将一抗按一定比例稀释 (稀释后的一抗 4℃可保存一周), 也可另行购买抗体稀释液。滴加稀释的一抗 37℃ 孵育 1 小时左右或 20℃ 2 小时左右, 也可 4℃过夜。PBS (pH7.2-7.4) 洗涤 3 次, 每次 2 分钟 (一抗的稀释度、孵育时间和温度与染色强度、背景有直接关系。一般来说, 阳性染色强度不够时, 可提高一抗浓度和延长孵育时间; 背景过高时, 可降低一抗浓度和缩短孵育时间)。

5. 根据用量, 用稀释液将 Bio-羊抗小鼠/兔 IgG 浓缩液按 1:50-100 稀释成工作液(1ml 稀释液加入 10-20ul Bio-羊抗小鼠/兔 IgG 浓缩液混匀, 此工作液 4℃可保存一周)。滴加 Bio-羊抗小鼠/兔 IgG 工作液, 20-37℃ 孵育 30 分钟。PBS (pH7.2-7.4) 洗涤 3 次, 每次 2 分钟。

6. 根据使用量，用稀释液将 SABC-FITC 浓缩液按 1:100 稀释成工作液(1ml 稀释液加入 10ul SABC-FITC 浓缩液混匀，此工作液 4℃可保存一周)。滴加 SABC-FITC 工作液，20-37℃，30 分钟。PBS (pH7.2-7.4) 洗涤 4 次，每次 5 分钟。

7. 滴加抗荧光衰减封片剂封片。荧光显微镜观察。

对于细胞爬片，固定后，PBS 漂洗两次，再用 0.5% Trxiton X-100 室温孵育 20 分钟， PBS 漂洗两次，接上述第 3 步。

对于冰冻切片，固定后，PBS 漂洗两次，再接上述第 2 步。

注意事项：

如果染色背景过高，在 SABC 反应之后，DAB 显色之前，用加有 0.01—0.02% TWEEN-20 的 PBST (pH7.2-7.4) 洗涤切片 4 次，PBS 洗 2 次，然后 DAB 显色。

相关产品：

A1800	抗体稀释液 (普通型)
A1810	一抗稀释液
A1820	HRP 标记抗体稀释液
P1110	4%组织细胞固定液
P2100	10×多聚赖氨酸
T8200	Triton X-100
P1032	20×PBS, PH7.2-7.4
P1031	1×PBST PH7.2-7.4 0.01M
C1010	柠檬酸钠缓冲液 0.01mol/L, pH6.0
X1020	0.1%胰蛋白酶液消化液
G1080	Mayer' 苏木素染液(免疫组化)